

# Terret noir N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Terret noir est d'origine languedocienne.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Terret noir

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Terret noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte ou jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à trois lobes, des sinus latéraux supérieurs à base en U et à lobes chevauchants, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé à lobes chevauchants, des dents moyennes à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	1998	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	131	151	1149	808	623	273	65
----	-----	-----	------	-----	-----	-----	----

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	223	243	176	188	252	238	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	131	223	247	182	204	252	240	257	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Terret noir possède un port érigé. Il est bien adapté à la conduite en gobelet ou en cordon.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Terret noir porte le numéro 1084.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont moyennes. Le Terret noir donne des vins légers, peu alcooliques et peu colorés.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Terret noir est assez sensible au mildiou et à l'oïdium. Il est également sensible aux maladies du bois.

### Debourrement



### Maturité



### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
  - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

---



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*