

Tressot N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage semble être originaire de l'Yonne.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Tressot

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union Européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Tressot est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds avec parfois présence à la base d'une dent, un sinus pétiolaire fermé à lobes très chevauchants, des dents courtes par rapport à leur largeur à la base, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, gaufré, plissé et parfois ondulé près du point pétiolaire, et à la face inférieure, une densité faible à moyenne des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année 2018

ha 0.3

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	137	223	239	176	194	246	238	216	239
Allele 2	141	236	249	186	200	256	254	267	239

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Tressot est généralement conduit en taille longue et palissé.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Tressot se montre surtout sensible à l'oïdium.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes et les baies petites. Le Tressot permet d'élaborer des vins bien colorés, charpentés et assez chaleureux.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier