

Verdesse B

Variété de raisin de cuve.



Origine

La Verdesse est originaire de l'Isère. D'après des analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait directement apparentée au Savagnin.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Verdesse

Synonymie

En Italie, la Verdesse est officiellement dénommé "Bian ver". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, la Verdesse est officiellement inscrite au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classée. Cette variété est également inscrite au catalogue en Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux feuilles adultes de couleur vert foncé, de petite taille, orbiculaires, à cinq, sept ou neuf lobes, avec des sinus latéraux profonds, un sinus pétiolaire en U ouvert ou fermé, des dents moyennes à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
-------	------	------	------	------	------	------	------

ha	19	12	2	3	2	2	10.4
----	----	----	---	---	---	---	------

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
----------------	------	-------	-------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Allele 1	131	225	239	176	188	246	240	233	239
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Allele 2	149	229	257	186	194	250	248	247	249
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage doit être taillé long. Il donne de bons résultats sur des coteaux argilo-calcaires.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Verdesse portent le numéro 931 et 1303. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans le vignoble de Savoie en 1999.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites à moyennes. La Verdesse donne des vins généreux et vifs, marqués par des odeurs végétales et florales.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La Verdesse est peu sensible à la pourriture grise mais craint d'avantage l'oïdium et le mildiou.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*