

Villard blanc B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Villard blanc est un hybride interspécifique qui provient d'un croisement faisant intervenir le Subéreux (6905 Seibel).

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Villard blanc

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "12375 Seyve-Villard" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Villard blanc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de la Hongrie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui est demi-ouverte, avec une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles rougeâtres et très brillantes,
- aux rameaux herbacés luisants, avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou légèrement réniformes, entières ou à trois lobes, avec des sinus latéraux peu profonds, un sinus pétiolaire en U ouvert parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents grosses, longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible à moyenne, un limbe lisse et brillant, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme ovoïde ou elliptique longue.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1998	2008	2018
ha	19199	21397	1129	439	133

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	229	237	178	178	256	240	233	239
Allele 2	141	234	251	186	194	262	254	235	255

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Villard blanc est une variété vigoureuse, assez fertile avec un port demi-érigé à horizontal. Il peut être conduit en taille courte ou en taille longue modérée et il est préférable de le palisser.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Villard blanc porte le numéro 1304.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes sont moyennes à grosses, peu compactes et les baies sont également moyennes à grosses. Le Villard blanc permet d'élaborer des vins de qualité courante.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Villard blanc résiste bien au mildiou et à la pourriture grise mais il est un peu sensible à l'oïdium et à l'anthracnose. Il doit de préférence être greffé. En dépit des tolérances décrites, une protection fongicide minimale est nécessaire pour protéger suffisamment la végétation et la vendange, notamment lors des millésimes où la pression des maladies est forte.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Cépages et vignobles de France, tome 1. P. Galet, 1988, Ed. Dehan, Montpellier, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*