

Humagne rouge N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage serait originaire du Val d'Aoste. D'après des analyses génétiques publiées, l'Humagne rouge serait directement apparenté au Cornalin du Valais.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Humagne rouge

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données règlementaires

En France, l'Humagne rouge est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste B. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés à surface côtelée avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes cunéiformes, à trois ou cinq lobes, avec des sinus latéraux moyennement profonds, un sinus pétiolaire en U fermé ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à grosses, à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe vert foncé, moyennement bullé, légèrement ondulé entre les nervures, et face inférieure, une densité des poils couchés et dressés nulle ou faible,
- aux baies qui sont de forme arrondie ou légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	194	240	238	247	249
Allele 2	137	225	257	186	194	246	238	267	251

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Humagne rouge est un cépage assez vigoureux et de fertilité régulière. Il est adapté aux sols moyennement ou peu fertiles et bien exposés.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Humagne rouge est peu sensible à la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Humagne rouge porte le numéro 6002.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies de l'Humagne rouge sont moyennes. Ce cépage permet d'élaborer des vins peu acides et légers. Le potentiel en sucre est moyen et une bonne maturité est requise pour éviter un caractère herbacé.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*