


# Admirable de Courtilier B

Variété de raisin de table.



## Origine

Cette variété a été obtenue par M. Courtilier au XIX<sup>ème</sup> siècle dans la région de Saumur. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre la Bicane et le Chasselas.

## Utilisation

Variété de raisin de table.

## Nom de la variété en France

Admirable de Courtilier

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Admirable de Courtilier est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux feuilles adultes pentagonales, à cinq ou sept lobes avec un sinus pétiolaire à fond en U, peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe lisse, brillant, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et une densité nulle ou très faible des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique ou ovoïde et dont l'épiderme peut prendre une teinte légèrement rosée en surmaturité.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	2000	2008	2018
ha	909	898	369	35	22	6.9

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	239	182	188	252	240	233	239
Allele 2	135	234	243	191	194	258	254	267	239

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Admirable de Courtilier présente une vigueur faible à moyenne et a un port demi-érigé. Son potentiel de rendement est moyen. Il a tendance à émettre beaucoup de grappillons et il est parfois sensible à la coulure et au millerandage. Il est préférable d'implanter l'Admirable de Courtilier sur des terrains secs et bien exposés.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Admirable de Courtilier porte le numéro 1308.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 2 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.


### Potentialités technologiques

Les grappes de l'Admirable de Courtilier sont moyennes et peu compactes. Les baies sont moyennes à grosses, à saveur simple, avec une pellicule fine à moyenne et une pulpe juteuse.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Admirable de Courtilier est peu sensible à la pourriture.

### Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*