

Philipp N

Variété d'agrément pour amateurs.



Origine

La variété Philipp (hybride interspécifique) a été obtenue par G. Weiss et G. Mayer en Autriche et provient d'un croisement entre l'Eger et l'Original.

Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

Nom de la variété en France

Philipp

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Philipp est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2013 sur la liste A.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui est demi-ouverte à fermée et qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées, avec une densité nulle à très faible des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge sur leur face ventrale et striés sur leur face dorsale,
- aux feuilles adultes orbiculaires ou pentagonales, à trois lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert en U, des dents très longues par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, un limbe plié, gaufré, une bullure nulle ou très faible et à la face inférieure, une densité faible à très faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont fusiformes et très pointues.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année 2018

ha 0

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	239	182	194	240	240	227	271
Allele 2	141	234	251	186	194	262	240	233	271

Aptitudes culturales et agronomiques

La variété Philipp a un port demi-érigé à érigé et elle est moyennement productive.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

La variété Philipp est assez tolérante vis-à-vis du mildiou, de l'oïdium et de la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Tafeltrauben: interessante neue Sorten. G. Goetz, 2005, Allemagne.
- Journal of Horticultural Research 2014, vol. 22(1): 101-107, J. Lisek, Pologne.

Phénologie

Epoque de débourrement : 16 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 2 semaines avant le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes de Philipp sont moyennes à grosses et compactes. Les baies sont également moyennes à grosses, avec une pulpe légèrement colorée, peu juteuse et très ferme.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier