

Sugrasixteen N

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1988 par D.W. Cain (Etats-Unis) et proviendrait d'un croisement entre le Black Monukka et le Sugrafive.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Sugrasixteen

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Sugrasixteen est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2014 sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité des poils couchés nulle à très faible,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune vert, qui présentent une densité nulle à très faible des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds à stries rouges,
- aux feuilles adultes grandes, pentagonales, à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en V, peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents de longueur moyenne par rapport à leur base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe involuté et à la face inférieure, une densité des poils couchés et des poils dressés nulle à très faible,
- aux baies qui sont de forme ovoïde ou elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	234	239	176	188	240	254	233	249
Allele 2	133	236	239	182	188	256	254	243	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Sugrasixteen a une vigueur moyenne et un port horizontal. Cette variété présente une fertilité réduite, elle est donc à conduire en taille longue et elle ne nécessite pas d'éclaircissage. Elle peut être parfois sensible au millerandage.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Sugrasixteen est un peu sensible au mildiou et à l'oïdium.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours avant le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes du Sugrasixteen sont grosses, homogènes et compactes. Les baies sont apyrènes, de taille moyenne, à saveur aromatique, avec une pellicule épaisse et une pulpe ferme. Les raisins se conservent bien après récolte.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*