

Sugraeighteen B

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété a été obtenue en 1990 par D.W. Cain (Etats-Unis) et proviendrait d'un croisement entre le Red Globe et un descendant de Muscat d'Alexandrie par Sugraone.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Sugraeighteen

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Sugraeighteen est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2014 sur la liste A. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Italie.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité des poils couchés nulle ou très faible,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées ou cuivrées, avec une densité des poils couchés nulle ou très faible,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds verts ou à stries rouges,
- aux feuilles adultes pentagonales ou orbiculaires, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire en V peu ouvert, des dents de longueur moyenne par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, plissé au point pétiolaire et à la face inférieure, une densité des poils couchés et des poils dressés nulle ou très faible,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	223	249	176	186	256	248	247	249
Allele 2	149	236	251	178	204	260	254	257	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Sugraeighteen est fertile, productif et a un port demi-érigé. Cette variété a une végétation vigoureuse qu'il faut maîtriser.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Sugraeighteen ne semble pas présenter de sensibilité particulière aux maladies et aux ravageurs.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 7 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, comme le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes du Sugraeighteen sont grosses et moyennement compactes. Les baies sont grosses, à saveur muscatée, avec une pellicule d'épaisseur fine à moyenne et une pulpe ferme et croquante. Les pépins sont mous et peu perceptibles. Les baies sont sensibles aux frottements et à l'éclatement et ne présentent pas une grande aptitude à la conservation.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier