

Goron de Bovernier N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage est originaire de Suisse. D'après des études génétiques, il serait lié au Cornalin du Valais.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Goron de Bovernier

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

France, le Goron de Bovernier est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2014 sur la liste B.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité des poils couchés nulle à faible,
- aux jeunes feuilles qui sont bronzées,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, à trois, cinq ou parfois sept lobes, avec un sinus pétiolaire en V ouvert à peu ouvert, des dents peu nombreuses de longueur courte par rapport à leur largeur à la base, à côtés convexes ou rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe parfois involuté, légèrement bullé et à la face inférieure, une densité nulle à très faible des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	225	239	186	194	248	240	227	239
Allele 2	149	225	247	186	194	260	262	243	261

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Goron de Bovernier est un cépage vigoureux et au port demi-érigé à horizontal. Il est sensible à la carence en magnésium.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Goron de Bovernier porte le numéro 1350.

Phénologie

Epoque de débourrement : 1 jour avant le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines à 3 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes du Goron de Bovernier sont de taille moyenne et compactes. Les baies sont petites à moyennes, à saveur simple, avec une pellicule fine. Il donne des vins aromatiques, moyennement alcooliques et avec une assez forte acidité totale.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Goron de Bovernier est très sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Principales variétés de vigne cultivées en Suisse. Ph. Dupraz et J-L. Spring, 2010, Ed. Agroscope, Suisse.
- Origine des cépages valaisans et valdotains. J. Vouillamoz et G. Moriondo, 2011, Ed. Belvédère, Suisse.
- Cépages suisses, histoires et origines. J. Vouillamoz, 2017, Ed. Favre, Suisse.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*