

# Artaban N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

La variété Artaban a été obtenue par l'INRA et le Julius Kühn Institut. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre un descendant de *Muscadinia rotundifolia* et le Regent.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Artaban

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, l'Artaban est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2018 sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées, avec une faible densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux feuilles adultes orbiculaires à cinq lobes avec des sinus latéraux supérieurs à fond en V et à lobes légèrement chevauchants, un sinus pétiolaire en V, fermé ou à bords parallèles en prolongation de la nervure centrale, des dents moyennes par rapport à leur base, à côtés rectilignes, une légère pigmentation anthocyanique des nervures, un limbe involuté, peu gaufré, moyennement bullé, à la face inférieure, une densité nulle à très faible des poils couchés et dressés,
- aux baies qui sont de forme aplatie ou arrondie, avec une pruine mouchetée et absente au niveau de l'ombilic.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

4.9

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	223	247	182	200	260	240	243	239
Allele 2	149	223	253	186	204	260	248	257	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

L'Artaban présente une vigueur moyenne et un port demi-érigé. Il est très sensible à la carence en magnésium, et il peut présenter un rougissement intense du feuillage à l'automne, ainsi que quelques difficultés d'aoûttement du fait de son arrêt de végétation tardif.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé d'Artaban porte le numéro 1267.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

### Debourrement


### Potentialités technologiques

Les grappes de l'Artaban sont grosses, de forme conique et compactes. Les baies sont petites, à saveur simple, avec une pellicule fine et une pulpe molle et juteuse. Les vins issus de l'Artaban sont légers, bien colorés, destinés à une consommation rapide et dominés par des arômes fruités.


### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Artaban est résistant au mildiou et à l'oïdium. En revanche, il est sensible au black rot et un peu à la pourriture grise.

D'après l'obtenteur, afin de préserver les facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser deux traitements fongicides mildiou et oïdium. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie.



## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- [Fiche variétale Artaban](#). INRAE Grand-Est Colmar, 2026.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*