

Floreal B

Variété de raisin de cuve.



Origine

La variété Floreal a été obtenue par l'INRA. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le Villaris et un descendant de *Muscadinia rotundifolia*.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Floreal

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Floreal est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2018 sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau aplatie, avec un liseré carminé et qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées, avec à la face inférieure une forte densité des poils couchés sur le limbe et une densité nulle ou très faible sur les nervures,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur verte,
- aux vrilles souvent poly-furquées (jusqu'à 6 ou 7 branches),
- aux feuilles adultes cordiformes ou pentagonales, entières ou à trois lobes, avec un sinus pétiolaire fermé à lobes chevauchants, des dents courtes par rapport à leur base, à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, bullé, faiblement gaufré et à la face inférieure, une faible densité des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme aplatie ou arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

7.9

Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	234	239	186	194	246	238	233	255
Allele 2	131	248	247	208	194	260	240	243	255

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Floreal est une variété vigoureuse, au port demi-érigé. Elle est sujette à la carence en magnésium et peut également se montrer sensible à la coulure. Sa conduite nécessite un palissage soigné.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Floreal porte le numéro 1265.

Phénologie

Epoque de débourrement : 13 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine à 1 semaine et demie après le Chasselas.


Debourement

Potentialités technologiques


Les grappes du Floreal sont petites et lâches. Les baies sont de taille moyenne, avec une pellicule d'épaisseur moyenne et une pulpe molle, moyennement juteuse. Ses vins sont expressifs, assez aromatiques et ont une bonne fraîcheur. Les fruits exotiques et le buis sont les arômes dominants.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Floreal est résistant au mildiou et à l'oïdium. Il est également partiellement résistant au black rot. Cette variété est cependant sensible à l'érinose. D'après l'obtenteur, afin de préserver les facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser deux traitements fongicides mildiou et oïdium. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie.



Maturité



Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- [Fiche variétale Floreal](#). INRAE Grand-Est Colmar, 2026.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*