

Nouveauté

Patricia INTA Rs

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.



Origine

Cette variété a été obtenue à la Station INTA de Mendoza (Argentine) par A. Gargiulo en croisant le Moscatel rosado par un descendant de Gibi et de Sultanine.

Utilisation

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.

Nom de la variété en France

Patricia INTA

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Patricia INTA est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A depuis 2021.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte, avec une faible densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur verte,
- aux feuilles adultes assez larges à cinq lobes, avec des sinus latéraux inférieurs peu profonds, un sinus pétiolaire en U ou V ouvert, des dents petites à moyennes, de longueur moyenne par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, finement bullé et à la face inférieure, une densité des poils couchés et des poils dressés nulle ou très faible,
- aux grappes rameuses, longues et souvent fasciées,
- aux baies qui sont de forme elliptique et de couleur jaune rosée à maturité.

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	143	225	249	176	188	256	240	257	255
Allele 2	149	232	253	191	204	258	248	267	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Patricia INTA a un port demi-érigé. En conditions favorables cette variété est très productive et donne de hauts rendements. Elle est sensible à la carence en magnésium.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Patricia INTA est très sensible au mildiou.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Patricia INTA porte le numéro 1364.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 5 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes du Patricia INTA sont grosses à très grosses, allongées et moyennement compactes. Les baies sont apyrènes, moyennes, à saveur légèrement muscatée, avec une pellicule fine. La coloration rosée des baies n'est atteinte qu'à pleine maturité. Lorsque les pépins sont présents, ils sont mous et peu perceptibles.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*