

Nouveauté

# Patricia INTA Rs

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.



## Origine

Cette variété a été obtenue à la Station INTA de Mendoza (Argentine) par A. Gargiulo en croisant le Moscatel rosado par un descendant de Gibi et de Sultanine.

## Utilisation

Variété destinée à l'élaboration de jus de fruits.

## Nom de la variété en France

Patricia INTA

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Patricia INTA est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A depuis 2021.

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une faible densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte, avec une faible densité des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur verte,
- aux feuilles adultes assez larges à cinq lobes, avec des sinus latéraux inférieurs peu profonds, un sinus pétiolaire en U ou V ouvert, des dents petites à moyennes, de longueur moyenne par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, finement bullé et à la face inférieure, une densité des poils couchés et des poils dressés nulle ou très faible,
- aux grappes rameuses, longues et souvent fasciées,
- aux baies qui sont de forme elliptique et de couleur jaune rosée à maturité.

# Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	143	225	249	176	188	256	240	257	255
Allele 2	149	232	253	191	204	258	248	267	271

## Aptitudes culturales et agronomiques

Le Patricia INTA a un port demi-érigé. En conditions favorables cette variété est très productive et donne de hauts rendements. Elle est sensible à la carence en magnésium.

## Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Patricia INTA est très sensible au mildiou.

## Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Patricia INTA porte le numéro 1364.

## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

## Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 5 semaines après le Chasselas.

## Potentialités technologiques

Les grappes du Patricia INTA sont grosses à très grosses, allongées et moyennement compactes. Les baies sont apyrènes, moyennes, à saveur légèrement muscatée, avec une pellicule fine. La coloration rosée des baies n'est atteinte qu'à pleine maturité. Lorsque les pépins sont présents, ils sont mous et peu perceptibles.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*