

Nouveauté

# Einset seedless Rs

Variété de raisin de table.



## Origine

L'Einset seedless a été obtenu par George Remaily (Etats-Unis). Il s'agit d'un hybride interspécifique qui provient d'un croisement entre le Fredonia (*Vitis labrusca* - *Vitis vinifera*) et le Canner seedless.

## Utilisation

Variété de raisin de table.

## Nom de la variété en France

Einset seedless

## Synonymie

Cette variété pouvait se rencontrer sous son code d'hybrideur "NY 63-878-1" mais ce synonyme n'a pas été retenu dans les textes réglementaires.

## Données réglementaires

En France, le Einset seedless est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2021 sur la liste A.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau de couleur verte, qui présente une densité forte des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages bronzées et à liseré carminé, avec une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux feuilles adultes moyennes à grandes, cunéiformes ou pentagonales, à trois ou cinq lobes avec des sinus latéraux peu profonds en U, un sinus pétiolaire en lyre fermé, des dents très petites, courtes par rapport à leur base, à côtés rectilignes ou concaves, une légère pigmentation anthocyanique au point pétiolaire, un limbe plan, finement bullé, et à la face inférieure, une densité faible des poils couchés et une densité nulle des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique courte et de couleur rose à maturité.

# Profil génétique

|          | MicrosatelliteVVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Allele 1 | 0                  | 232   | 235   | 182    | 0       | 0       | 242    | 0      | 0      |
| Allele 2 | 0                  | 234   | 239   | 191    | 0       | 0       | 248    | 0      | 0      |

## Aptitudes culturales et agronomiques

L'Einset seedless est une variété vigoureuse et plutôt productive, qui résiste assez bien au froid de l'hiver.

## Sélection clonale en France


Il n'y a pas encore de clone agréé de cette variété.

## Phénologie


Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : précoce, 1 semaine avant le Chasselas.

## Debourrement



## Maturité



## Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- New York's food and life sciences bulletin, B. Reisch et al., 1985.
- Table grapes for cool climates, B. Reisch et al., 1993.



---

*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*