


Calitor N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Calitor est un cépage d'origine provençale.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Calitor

Synonymie

En France, cette variété peut officiellement être nommée "Pécoui touar" pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, le Calitor est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert ou à lobes légèrement chevauchants, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe tourmenté, involuté et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	299	319	195	204	60	40	11

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	239	176	186	252	238	235	239
Allele 2	131	236	249	182	204	252	240	235	255

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Calitor est un cépage fertile et productif qui peut être conduit en taille courte.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Calitor est sensible au mildiou et à la pourriture grise. En revanche, il résiste très bien à l'oïdium.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 8 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Le Calitor donne des vins légers, plats, sans acidité et peu colorés.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*