

Camaralet B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage provient du vignoble des Pyrénées.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Camaralet

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Camaralet est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles à plages bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec des sinus latéraux profonds, ouverts, à fond en U avec présence assez fréquente d'une dent au fond, un sinus pétiolaire ouvert, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe plan et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies de forme légèrement elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	1998	2008	2018
ha	4	2	2	1	8

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	243	178	188	246	240	227	239
Allele 2	149	234	249	186	200	260	254	233	271

Aptitudes culturales et agronomiques

[en cours de rédaction]

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

De par ses grappes très lâches, le Camaralet est généralement peu sensible à la pourriture grise, sauf lorsque la maturité est dépassée.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Camaralet portent les numéros 1023 et 1024. Un conservatoire d'une dizaine de clones a été implanté dans le vignoble de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques).

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2ème époque, 3 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

La renommée de ce cépage repose sur la qualité de ses vins très fins (alcooliques, mielleux, amples) et leur typicité aromatique (cannelle, poivre, fenouil).



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier