

# Candin B

Variété d'agrément pour amateurs.



## Origine

Cette variété a été obtenue en 1981 par l'INRA. Il s'agit d'un hybride interspécifique issu d'un croisement entre le 7489 INRA et le Muscat de Hambourg.

## Utilisation

Variété d'agrément pour amateurs.

## Nom de la variété en France

Candin

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Candin est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur liste A.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires de couleur vert clair, à cinq ou sept lobes, avec un sinus pétiolaire à fond en U, ouvert, des dents longues par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou avec un côté concave et un côté convexe, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle ou très faible, un limbe lisse, brillant, fin, involuté, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme elliptique, à saveur muscatée.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année

2018

ha

0

## Profil génétique

	MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	131	229	247	176	194	238	236	243	271
Allele 2	133	236	260	186	196	252	254	245	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Le Candin présente une vigueur moyenne. C'est une variété avec un port demi-érigé à érigé qui peut être conduite en taille longue modérée.

### Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Candin porte le numéro 5004.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 6 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 1ère époque, 1 semaine après le Chasselas.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France.

Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

### Potentialités technologiques

Les grappes de Candin sont moyennes à grosses, peu compactes et les baies sont grosses, avec une pulpe ferme, peu juteuse.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Candin est peu sensible au mildiou, à l'oïdium, à l'anthracnose, au black rot et à la pourriture grise mais il doit être greffé.

En dépit des tolérances décrites, une protection fongicide minimale est nécessaire pour protéger suffisamment la végétation et la vendange, notamment lors des millésimes où la pression des maladies est forte.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*