

Nouveauté

Taranis N

Variété de raisin de cuve.

Origine

La variété Taranis est un hybride interspécifique obtenu par l'INRAE et l'Agroscope. Elle est issue d'un croisement entre le Voltis et un descendant de *Muscadinia rotundifolia*.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Taranis

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Taranis est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" depuis 2026 sur la liste A, mais n'est pas encore classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité moyenne des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur vert à plages bronzées, avec une densité moyenne des poils couchés,
- aux rameaux herbacés de couleur rouge ou à stries rouges,
- aux feuilles adultes moyennes, orbiculaires, à trois lobes, avec des sinus latéraux supérieurs peu profonds, un sinus pétiolaire en U ouvert, des dents petites, moyennes par rapport à leur base, à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures faible, un limbe fin, brillant, vert clair, plan, faiblement bullé, et à la face inférieure, une densité nulle ou très faible des poils couchés et des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	135	223	249	182	194	248	243	249	238
Allele 2	149	248	262	186	200	252	243	271	246

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Taranis présente un port horizontal, une vigueur moyenne et est relativement peu fertile. Il s'agit d'une variété assez sensible à la carence en magnésium.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Taranis porte le numéro 1417.

Phénologie

Epoque de débourrement : 18 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Références bibliographiques

- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.

- [Fiche variétale Taranis](#). INRAE SVQV, 2026.

Potentialités technologiques

Les grappes sont de taille moyenne et très compactes. Les baies sont de taille moyenne avec une pellicule épaisse.

Le Taranis permet d'obtenir des vins au profil aromatique complexe avec des notes végétales, charpentés et tanniques.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Taranis est résistant au mildiou et à l'oïdium. Cette variété est en revanche sensible au black rot. Cette variété est également sensible à la pourriture grise. D'après l'obteneur, afin de préserver les facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser deux traitements fongicides mildiou et oïdium. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*