

Carignan blanc B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété est la mutation blanche du Carignan.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Carignan blanc

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Carignan blanc est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de Chypre.

Éléments de description

La description correspond à celle du Carignan, à l'exception de la couleur de l'épiderme des baies à maturité qui, dans ce cas, est vert-jaune.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| ha | 1652 | 1951 | 2316 | 1778 | 1089 | 621 | 198 |
|----|------|------|------|------|------|-----|-----|

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 1 | 141 | 223 | 239 | 178 | 186 | 252 | 240 | 247 | 249 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allele 2 | 143 | 225 | 239 | 182 | 188 | 260 | 254 | 257 | 251 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Aptitudes culturales et agronomiques

La fertilité importante et régulière de ce cépage permet de le tailler court.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Carignan blanc porte le numéro 1256.

Phénologie

Epoque de débourrement : 10 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses et les baies sont de taille moyenne. Le vin obtenu est assez alcoolique et relativement neutre.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Comme le Carignan, ce cépage est particulièrement sensible à l'oïdium.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
 - Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro
- ©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Montpellier, Marseillan, France.

- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*