


Chasan B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1958. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre le Listan et le Pinot.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Chasan

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Chasan est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite au catalogue de l'Espagne.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible ou très faible des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux rameaux herbacés avec des entre-nœuds de couleur rouge,
- aux feuilles adultes orbiculaires, à sept lobes ou plus, avec des sinus latéraux profonds à fond en U, un sinus pétiolaire ouvert, des dents moyennes à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2008	2018
ha	238	1058	960	428

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	143	225	239	182	194	240	240	216	239
Allele 2	149	236	239	182	194	252	248	247	255

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Chasan doit être palissé et taillé court car il est fertile, productif et émet des rameaux longs à port retombant.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Chasan porte le numéro 538.

Phénologie

Epoque de débourrement : 5 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 1ère époque, 1 demi-semaine après le Chasselas.


Debourrement

Potentialités technologiques


Les grappes sont très grosses et les baies sont de taille moyenne. Le Chasan permet l'élaboration de produits aromatiques mais sensibles à l'oxydation. Il semble bien adapté pour les zones fraîches car l'acidité chute très rapidement au cours de la maturation et atteint souvent des niveaux très bas en région méridionale.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Cette variété précoce résiste très bien à la pourriture grise mais elle se montre sensible à l'excoriose, à l'oïdium et dans une moindre mesure, au mildiou et aux acariens.



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*