

Clarín B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Cette variété a été obtenue par l'INRA en 1953. D'après les analyses génétiques réalisées à Montpellier, elle serait issue d'un croisement entre le Carignan et le Cinsaut.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Clarín

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Clarín est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur jaune,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de grande taille, à sept ou neuf lobes, avec un sinus pétiolaire à fond parfois limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents moyennes à côtés convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures nulle, un limbe bullé, gaufré, et à la face inférieure, une densité moyenne des poils dressés,
- aux baies de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1988	2000	2008	2018
ha	4	8	8	4.4

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	223	239	176	188	252	240	227	251
Allele 2	143	223	243	182	188	256	248	247	261

Aptitudes culturales et agronomiques

Cette variété fertile, productive et possède un port érigé. Elle peut ainsi être taillée court et conduite en gobelet.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Clarin est parfois un peu sensible à la pourriture grise.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Clarin porte le numéro 761.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont grosses. Les vins obtenus avec cette variété sont relativement neutres.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*