

Courbu noir N

Variété de raisin de cuve.



Origine

Le Courbu noir est un cépage autochtone du vignoble pyrénéen. Il ne correspond pas à la forme noire du Courbu.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Courbu noir

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Coubu noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles de couleur rouge, très bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec des sinus latéraux ouverts, un sinus pétiolaire ouvert et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents petites à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	2000	2008	2018
ha	10	11	1	1	1.2

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	236	239	172	188	248	238	233	239
Allele 2	137	236	249	178	200	260	248	243	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage peu productif doit être conduit en taille longue.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Courbu noir se montre assez sensible à l'oïdium mais résiste mieux au mildiou.

Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Courbu noir portent les numéros 728 et 729.

Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Courbu noir donne des vins fins, légers en couleur et en alcool mais relativement astringents.



Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier