

# Courbu noir N

Variété de raisin de cuve.



## Origine

Le Courbu noir est un cépage autochtone du vignoble pyrénéen. Il ne correspond pas à la forme noire du Courbu.

## Utilisation

Variété de raisin de cuve.

## Nom de la variété en France

Courbu noir

## Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

## Données réglementaires

En France, le Coubu noir est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé.

---

## Éléments de description

L'identification fait appel :

- aux jeunes feuilles de couleur rouge, très bronzées,
- aux feuilles adultes à cinq lobes avec des sinus latéraux ouverts, un sinus pétiolaire ouvert et présence assez fréquente d'une dent sur le bord, des dents petites à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyanique des nervures moyenne à forte, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

# Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1979	1988	2000	2008	2018
ha	10	11	1	1	1.2

## Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VMD5	VMD7	VMD27	VRZAG62	VRZAG79	VMD25	VMD28	VMD32
Allele 1	131	236	239	172	188	248	238	233	239
Allele 2	137	236	249	178	200	260	248	243	271

### Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage peu productif doit être conduit en taille longue.

### Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Courbu noir se montre assez sensible à l'oïdium mais résiste mieux au mildiou.

### Sélection clonale en France

Les deux clones agréés de Courbu noir portent les numéros 728 et 729.

### Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

### Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.  
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines après le Chasselas.

### Potentialités technologiques

Les grappes et les baies sont petites. Le Courbu noir donne des vins fins, légers en couleur et en alcool mais relativement astringents.



*Plantgrape, tous droits réservés,  
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®  
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*