


Dabouki B

Variété de raisin de table.



Origine

Cette variété de raisin de table d'origine naturelle est répandue au Proche-Orient.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Dabouki

Synonymie

Aucun synonyme n'est officiellement reconnu en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne pour cette variété.

Données réglementaires

En France, le Dabouki est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Espagne et Portugal.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles bronzées ou rougeâtres,
- aux feuilles adultes orbiculaires, de grande taille, à cinq, sept ou plus de sept lobes, avec des sinus latéraux à fond en U ou plats, un sinus pétiolaire peu ouvert ou fermé à fond en U, des grosses dents, de longueur moyenne par rapport à leur largeur à la base, à côtés rectilignes ou convexes, une pigmentation anthocyanique des nervures forte, un limbe fortement bullé, involuté, et à la face inférieure, une densité moyenne à forte des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique.

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	23	56	202	101	20	17	6.2

Profil génétique

Microsatellite	VVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1	133	232	247	176	188	248	240	257	249
Allele 2	149	234	249	180	204	248	244	257	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Dabouki est une variété vigoureuse, au port horizontal, et son potentiel de production est moyen. Il peut être conduit en taille courte ou en taille longue modérée. Le Dabouki résiste bien à la sécheresse et il est peu sujet à la coulure et au millerandage.

Sélection clonale en France

Le seul clone agréé de Dabouki porte le numéro 1103.

Phénologie

Epoque de débourrement : 12 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 3ème époque, 5 semaines après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses à très grosses et de compacité moyenne. Les baies sont également très grosses avec une pellicule épaisse et une pulpe charnue à saveur simple. L'aptitude à la conservation et au transport de cette variété est bonne.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

En conditions humides, le Dabouki est sensible au mildiou, à l'oïdium ainsi qu'à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*