Dattier de Beyrouth B

Variété de raisin de table.

Origine

Cette variété de raisin de table, d'origine naturelle, se rencontre dans de nombreux pays.

Utilisation

Variété de raisin de table.

Nom de la variété en France

Dattier de Beyrouth

Synonymie

Dans l'Union européenne, le Dattier de Beyrouth est officiellement désigné par d'autres noms : Afuz Ali (Croatie, Hongrie, Roumanie), Bolgar (Bulgarie), Roseti (Espagne) et Rozaki (Grèce). Ces synonymes sont officiellement reconnus en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données règlementaires

En France, le Dattier de Beyrouth est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Bulgarie, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Portugal et Roumanie.

Éléments de description

L'identification fait appel :
- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une densité faible des poils couchés,
- aux jeunes feuilles vertes à plages bronzées,
- aux rameaux herbacés avec des entre-noeuds longs,
- aux feuilles adultes petites à moyennes, orbiculaires, à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire ouvert, à bords parallèles et à fond en U souvent limité par la nervure près du point pétiolaire, des dents petites à moyennes, à côtés rectilignes, une pigmentation des nervures nulle ou faible, un limbe lisse, brillant, et à la face inférieure, une densité nulle des poils dressés et des poils couchés,
- aux baies qui sont de forme elliptique longue ou cylindrique.

©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Evolution des surfaces cultivées en France

Année	1958	1968	1979	1988	2000	2008	2018
ha	1508	1591	5695	191	42	49	24

Profil génétique

MicrosatelliteVVS2	VVMD5	VVMD7	VVMD27	VRZAG62	VRZAG79	VVMD25	VVMD28	VVMD32
Allele 1 131	223	239	182	186	244	248	233	257
Allele 2 133	229	249	182	188	252	254	257	271

Aptitudes culturales et agronomiques

Le Dattier de Beyrouth est une variété vigoureuse, avec un port demi-érigé à horizontal. Il peut être conduit en taille courte ou en taille longue mais il doit être soigneusement palissé car l'empattement des rameaux est fragile au printemps et les rameaux sont sensibles au vent. Le Dattier de Beyrouth est également sensible à la coulure et au millerandage.

Sélection clonale en France

Les trois clones agréés de Dattier de Beyrouth portent les numéros 304, 966 et 1223.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses à très grosses, lâches ou de compacité moyenne. Les baies sont très grosses avec une pellicule épaisse et une pulpe charnue à saveur simple. Cette variété présente une bonne aptitude à la conservation et au transport.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Dattier de Beyrouth est très sensible au mildiou et à l'excoriose. Il est aussi sensible à la pourriture grise.

Phénologie

Epoque de débourrement : 9 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 3ème époque, 4 semaines et demie après le Chasselas.

Debourrement



©2023 Plantgrape, tous droits réservés

Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.

Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne®
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier

©2023 Plantgrape, tous droits réservés