

Elbling B

Variété de raisin de cuve.



Origine

Ce cépage autrefois cultivé dans le Nord-Est de la France est, d'après les analyses génétiques publiées, probablement un descendant du Gouais blanc.

Utilisation

Variété de raisin de cuve.

Nom de la variété en France

Elbling

Synonymie

En Autriche, l'Elbling est officiellement dénommé "Weisser Elbling". Ce synonyme est officiellement reconnu en France pour ce qui concerne le matériel végétal de multiplication.

Données réglementaires

En France, l'Elbling est officiellement inscrit au "Catalogue des variétés de vigne" sur la liste A et classé. Cette variété est également inscrite aux catalogues d'autres pays membres de l'Union européenne : Allemagne et Luxembourg.

Éléments de description

L'identification fait appel :

- à l'extrémité du jeune rameau qui présente une forte densité des poils couchés,
- aux jeunes feuilles de couleur verte à plages légèrement bronzées,
- aux feuilles adultes à trois ou cinq lobes, avec un sinus pétiolaire peu ouvert à base en V, des dents longues à côtés rectilignes, une pigmentation anthocyannique des nervures moyenne, un limbe involuté, gaufré, plissé près du point pétiolaire, bullé, et à la face inférieure, une faible densité des poils dressés et couchés,
- aux baies qui sont de forme arrondie.

Evolution des surfaces cultivées en France

| Année | 1958 | 1968 | 1979 | 1988 | 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|
| ha | 323 | 127 | 3 | 2 | 1.1 |

Profil génétique

| Microsatellite | VVS2 | VMD5 | VMD7 | VMD27 | VRZAG62 | VRZAG79 | VMD25 | VMD28 | VMD32 |
|----------------|------|------|------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Allele 1 | 141 | 236 | 249 | 176 | 194 | 238 | 248 | 227 | 239 |
| Allele 2 | 149 | 238 | 257 | 186 | 204 | 246 | 254 | 233 | 271 |

Aptitudes culturales et agronomiques

L'Elbling est un cépage très vigoureux qui doit être taillé à longs bois. Il se montre sensible à la carence en magnésium.

Sélection clonale en France

Il n'y a pas encore de clone agréé de ce cépage.

Phénologie

Epoque de débourrement : 3 jours après le Chasselas.

Epoque de maturité : 2ème époque, 2 semaines et demie après le Chasselas.


Potentialités technologiques

Les grappes sont petites alors que les baies sont grosses. L'Elbling donne des vins acides et ordinaires.


Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

L'Elbling est sensible au mildiou et aux vers de la grappe. Il est très sensible à la pourriture grise.

Debourrement



Maturité



Références bibliographiques

- Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France. Collectif, 2007, Ed. IFV, Le Grau-du-Roi, France.
- Fonds documentaire du Centre de Ressources Biologiques de la Vigne de Vassal-Montpellier, INRAE - Institut Agro Montpellier, Marseillan, France.
- Dictionnaire encyclopédique des cépages et de leurs synonymes. P. Galet, 2015, Ed. Libre&Solidaire, France.
- Traité général de viticulture, Ampélographie. P. Viala et V. Vermorel, 1901-1909, Ed. Masson, Paris, France.



*Plantgrape, tous droits réservés,
plantgrape.fr, UMT Géno-Vigne@
INRAE - IFV - L'Institut Agro Montpellier*